

INRA-JKI Col-58E

VassV6R08s101-105



Collection Vassal-Montpellier

5000Mtp213

5000Mtp 213

INRA-JKI Col-58E

V6R08s101-105

INRA-JKI Col 58E

5000 Mtp 213

VASSAL 2015









Formulaire de description 5 / 8
Observation à maturité physiologique

Année : 2016-2017

Code cépage :

Code introduction : 5000Mlp213

Observateur : T. LAONDE

[+ V6R8/101-105] 10/11

Nom introduction : INRA-JKi G258E

Emplacement : V6R8/101-105 + 106-110

GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : 15	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	moyenne (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 12	très étroite (<5 cm)	étroite (5-10 cm)	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	moyen	fort	très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : 7+	très court (<3 cm)	court (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	à la base seulement		jusqu'à la moitié	plus de la moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	2-non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-cylindrique	2-conique	3-en entonnoir		
Oiv 209	Nombre d'ailes de la grappe principale	1-absentes	2- Une à deux ailes	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

BAIE

Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en mm) : <u>16</u>					très courte ($<8\text{mm}$)	courte (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	longue (20-26mm)	très longue ($>26\text{mm}$)	
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en mm) : <u>17</u>					très étroite ($<8\text{mm}$)	étroite (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	large (20-26mm)	très large ($>26\text{mm}$)	
Oiv 222	Uniformité de la grosseur					1-non uniforme	3-uniforme				
Oiv 223	Forme	1- sphérique aplati	2- sphérique	3- elliptique courte	4- elliptique longue	5- cylindriq ue	6- troncovoï de	7- ovoïde	8- obovoïde	9- arquée	10- fusiforme
Oiv 225	Couleur épiderme			1- vert jaune		2- rose	3- rouge	4- gris	5-rouge foncé violet		6- bleu noir
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme					1- non uniforme	3- uniforme				
Oiv 227	Pruine					nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte	
Oiv 228	Epaisseur pellicule					très mince	mince	moyenne	épaisse	très épaisse	
Oiv 229	Ombilic (apparence)					1- peu apparent	2- apparent				
000-18	Région ombilicale (dépression)					1- déprimée	2- non déprimée				
Oiv 230	Coloration de la pulpe					1-non colorée	2- colorée				
Oiv 231	Intensité de la pigmentation anthocianique de la pulpe					nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte	
Oiv 232	Succulence de la pulpe					1- peu juteuse	2- moyenneme nt juteuse	3- très juteuse			
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)						faible	moyen	élevé		
Oiv 235	Fermeté de la pulpe					1- molle	2- légèrement ferme	3- très ferme			
Oiv 236	Saveur					1-aucune	2- muscatée	3- foxée	4- herbacée	5-autre	
Oiv 238	Longueur pédicelle <u>7</u>					très court ($<4\text{mm}$)	court (4-8mm)	moyen (8-12mm)	long (12-16mm)	très long ($>16\text{mm}$)	
Oiv 240	Séparation du pédicelle					1- très facile	2- facile	3- difficile			

PEPINS

Oiv 241	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)		2- rudimentaire (type sultanien)		3-complète
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7	très courts	courts	moyens	longs	très longs
Oiv 243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) :	très faible ($<10\text{mg}$)	faible (25mg)	moyen (40mg)	élevé (55mg)	très élevé ($>65\text{mg}$)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-absentes	2-présentes			

long étroits (b.p.) 2017

vu forte encore sur J.f. le 25/6/2015

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2015 2016 + 2017

Code cépage :

Code introduction : 5000Mtp213

Observateur : LACONBE + [V6R7 1101-105] 30//

Nom introduction : INRA-JK1 Col 58E

Emplacement : V6R08 1101-105 + 106-110

		LIMBE				
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille du limbe	très petite	petite	moyenne	grande	très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-cordiforme	2-cunéiforme	3-pentagon.	4-orbicul.	5-rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	2-trois	3-cinq	4-sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		vert clair	vert moyen	vert foncé	
Oiv 070	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc.
Oiv 071	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc.
Oiv 074	Profil du limbe	1-plan	2-en V	3-involuté	4-révoluté	5-tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	absente				présente
Oiv 072	Gaufre du limbe (dépression entre nervures I et II)	absente ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 075	Cloûre de la face sup. du limbe (relief entre nervures de dernier ordre)	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv. principales face sup	absente				présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	absente				présente
000-44	Densité p. couchés limbe face sup.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
000-45	Densité p. dressés limbe face sup.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte

		PETIOLE				
Oiv 090	Densité poils couchés sur le pétiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 091	Densité poils dressés sur le pétiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	plus court	légèrement plus court	égal	légèrement plus long	plus long
000-06	Couleur du pétiole	1-coloré	2-partiellement coloré	3-vert		

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole	très ouvert	ouvert	fermé	chevauchant	très chevauchant
Oiv 080	Forme de la base du sinus pétiole	1- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 81-1	Dent dans la sinus pétiole	absents				présents
Oiv 81-2	Base du sinus pétiole limité par la nervure	1-non limité	2- sur un côté	3- sur les deux côtés		

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs	1- ouverts	2- fermés	3- légèrement chevauchants	4- très chevauchants	5- absence de sinus
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	Absence ou très peu profond	peu profond	moyens	profonds	très profonds
Oiv 83-1	Forme de la base des sinus latéraux supérieurs	1- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 83-2	Dent dans les sinus latéraux supérieurs	absentes				présents

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme des dents	1- à deux côtés concaves	2- à deux côtés rectilignes	3- à deux côtés convexes	4- un côtés concaves un côtés convexes	5- mélange notation 2 et notation 3
Oiv 077	Taille des dents par rapport à la taille du limbe	très petites	petites	moyennes	grandes	très grandes
Oiv 078	Longueur des dents par rapport à leur largeur	très courtes	courtes	moyennes	longues	très longues

AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE À CETTE PÉRIODE

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)
---------	--	--------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version OIV 2007, format 2011

très fertile + grappillon.

Déjà rougissant feuilles base le 25/5/15
= carence magnésium ? oui 2016

Formulaire de description 2 / 8
(stade floraison)

Année : 2015 2016

Code cépage : 2017

Nom introduction : INRA-JKI GR SBE

Observateur : LACOMBE

Code introduction : 500011p 213

Emplacement : V6R08/101-105+106-110

BOURGEONNEMENT

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 001	Ouverture de l'extrémité	fermé (globuleuse)	demi-ouverte	complètement ouverte		
Oiv 002	Distribution de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	1-absente	2- en liseré	3-partout		
Oiv 003	intensité de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 004	densité des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 005	densité poils dressés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

JEUNES FEUILLES

Oiv 051	couleur de la face supérieure du limbe (4° feuille)	1- verte	2- jaune	3- bronzées	4. cuivrées rougeâtre	
Oiv 053	densité poils couchés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 054	densité poils dressés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 055	densité poils couchés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 056	densité poils dressés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

JEUNES FEUILLES DU HAUT (3 PREMIERES DETACHEES)

000-28	Profil	1. étalées	2. en gouttière	3. autres		
000-29	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible 299	faible 202	moyenne 203	très forte 204	
000-30	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible 280	moyenne 200	très forte 201		
000-31	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-32	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-33	Couleur face sup.	blanc 205	fauve roux 206	carminé 207	liseré carminé 208	jaune 209
		plages bronzées ou cuivrées 210			vertes 212	autre 213

JEUNES FEUILLES DU BAS (3 SUIVANTES)

000-34	Profil	plan 1	en gouttière 2	involuté 3	révoluté 4	tourmenté 5
000-35	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible 285	faible 223	moyenne 224	très forte 225	
000-36	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible 284	moyenne 215	très forte 216		
000-37	Densité poils couchés nervure face inf	nulle ou très faible 283	faible 217	moyenne 218	très forte 219.	
000-38	Densité poils dressés nervure face inf	nulle ou très faible 282	moyenne 215	très forte 216		
000-39	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-40	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-41	Couleur face sup.	blanc 226	fauve roux 227	carminé 228	liseré carminé 229	jaune 230
		plages bronzées ou cuivrées 231		entièrement bronzées ou cuivrées 232		vertes 233

Evita: nulle hypertrophies

1/2 env. à l'origine (sera traitée avec à palmer)
CTL+SNB 11/5/2016

Formulaire de description 3/8
(Stade floraison)

Année : 2016 + 2017

Observateur : LACOTHE

Code cépage

Code introduction : 5000 M/p 213

Nom introduction : INRA-JKI QP 58E

Emplacement : V6 R08, 101-105 + 106 + 110

Rameau herbacé

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 006	Port	érigé	demi-érigé	<u>horizontal</u>	demi retombant	retombant
Oiv 351	Vigueur du rameaux	très faible	faible	moyen	<u>forte</u>	très forte
Oiv 007	Couleur face dorsale entrenoeuds	1- verte	<u>2- verte et rouge</u>	3- rouge		
Oiv 009	Couleur face dorsale noeuds	1- verte	<u>2- verte et rouge</u>	3- rouge		
Oiv 008	Couleur face ventrale entrenoeuds	<u>1- verte</u>	2- verte et rouge	3- rouge	→ rouge vif curieux latéral (entre dos et ventral) à l'opposé de la Feuille	
Oiv 010	Couleur face ventrale noeuds	1- verte	<u>2- verte et rouge</u>	3- rouge		
Oiv 014	Densité poils couchés entrenoeuds	<u>nulle ou très faible</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 013	Densité poils couchés noeuds	<u>nulle ou très faible</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 012	Densité poils dressés entrenoeuds	<u>nulle ou très faible</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 011	Densité poils dressés noeuds	<u>nulle ou très faible</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 015-2	Intensité pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons	<u>nulle ou très faible</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 016	Distribution vrilles	<u>1- 2 ou moins</u>	2- 3 ou plus	il manque parfois une vrille		
Oiv 017	longueur vrilles Valeur absolue (en cm) : 24	très courtes (<10cm)	courtes (15cm)	<u>moyennes (20cm)</u>	<u>longues (25cm)</u>	très longues (>30cm)

Inflorescence

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 151	Sexe de la fleur	1- mâle	2- mâle à hermaphrodite	<u>3- hermaphrodite</u>	4- femelle à étamines réflexes	5- femelle à ovaires réflexes
Oiv 152	Niveau insertion 1° inflorescence	1- jusqu'au 2° noeud	<u>2- 3° et 4° noeud</u>	3- à partir du 5° noeud		
Oiv 153	Nombre inflorescence/rameau	1- 1 ou moins	<u>2- 1,1 à deux</u>	3- 2,2 à trois	4- plus de trois	
Oiv 155	Fertilité des bourgeons de la base	très faible		<u>moyenne</u>		très élevée
Oiv 501	Taux de nouaison	très faible (<10%)	faible 20%	moyen 40%	élevé 60%	très élevé (=>80%)

Vassal

000-42	Relief surface du rameau herbacé	1- unie	<u>2- côtelée</u>		
000-10	Villosité spéciale du rameau herbacé	1- épines ou analogues	2- poils massifs	<u>3- aucune</u>	
000-21	Couleur des vrilles	1- jaune	<u>2- rouge clair</u>	3- rouge foncé	4- vert
000-43	Taille du bouton floral	1- petit	<u>2- moyen</u>	3- gros	

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2016 + 2017

Code cépage :

Code introduction : 5000Htp213

Observateur : Lacombe

Nom introduction : INRA-JKI Gb #11E

Emplacement : VGR8R 101-105

58

+ 106-110

Sarment

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 101	Section transversale	1-circulaire	2-elliptique	3- aplatie		
Oiv 102	Relief de la surface	1- uni	2- côtelé	3- strié		
Oiv 103	Couleur générale	1- jaune	2- brunâtre foncé	3- rouge violacé	4- gris	
Oiv 104	Lenticelles	absentes				présentes
Oiv 105	Poils dressés des nœuds	absents				présents
Oiv 106	Poils dressés des entrenœuds	absents				présents
Oiv 351	Vigueur du rameau*	très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	Croissance prompts-bourgeons	absent ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 353	Longueur entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 150	très courts (<60mm)	courts (90mm)	moyens (120mm)	longs (150mm)	très longs (>180mm)
Oiv 354	Diamètre entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 12	très petit (<5mm)	petit (8mm)	moyen (11mm)	grand (14mm)	très grand (>17mm)

Suppléments pour Porte-greffe

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 551	Rendement en bois/ha	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé
Oiv 552	Formation de cal de soudure	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé
Oiv 553	Aptitude à la rhizogenèse	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé

Vassal

000-47	Epaisseur des nœuds par rapport au mérithalle	1- aplatis	2- moyens	3- saillants		REVOIR
000-48	Pruine sur sarment	1- absence	2- partiellement présente	3- présente		

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »